

**Регистрационный номер:** П N012303/01

**Торговое наименование:** Респеро Миртол

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Миртол

**Лекарственная форма:** капсулы кишечнорастворимые

**Состав:**

1 капсула препарата содержит:

Активный компонент:

Миртол стандартизированный 120 мг

**Вспомогательные вещества:** Среднецепочечные триглицериды

**Состав оболочки капсулы:**

Желатин, глицерол, сорбитол, хлористоводородной кислоты раствор 13%

Кишечнорастворимая оболочка капсулы: гипромеллозы ацетата сукцинат, триэтилцитрат, натрия лаурилсульфат, тальк, декстрин, аммония глицирризинат

**Описание:**

Овальные мягкие полупрозрачные желатиновые капсулы. Содержимое капсул - маслянистая прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

**КОД АТХ:** K05C

**Фармакологические свойства:**

Оказывает муколитическое, противовоспалительное, антибактериальное действие.

*Фармакокинетические свойства*

Хорошо всасывается в тонком кишечнике. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1- 3 часа после приема препарата. Приблизительно 60 % препарата и его метаболитов выводится с мочой, 5 % - с калом, около 2 % - легкими. Может проникать через плацентарный барьер; в молоко кормящих женщин.

**Показания к применению:**

Применяют в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (синуситы, острый и хронический бронхиты).

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчнокаменная болезнь, мочекаменная болезнь, бронхиальная астма, 1 триместр беременности, период грудного вскармливания, детский возраст до 6 лет, заболевания печени; наследственная непереносимость фруктозы (так как препарат содержит сорбитол).

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:**

В связи с отсутствием специальных исследований при беременности (II-III триместр) препарат следует применять с осторожностью по назначению врача при условии, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Применение препарата в период грудного вскармливания противопоказано.

**Способ применения и дозы:**

Препарат принимают внутрь, у взрослых и детей старше 6 лет, за 30 минут до еды, запивая достаточным количеством воды комнатной температуры.

Детям от 6 до 12 лет при остром воспалении назначают по 1 капсуле 3 - 4 раза в день, при хроническом воспалении - по 1 капсуле 2 - 3 раза в день.

Детям от 12 до 18 лет при остром воспалении назначают по 1 капсуле 4 - 5 раз в день, при хроническом воспалении - по 1 капсуле 2 - 3 раза в день.

Взрослым назначают при остром воспалении по 2 капсулы 3 - 5 раз в день (6 - 10 капсул в сутки), при хроническом - по 2 капсулы 2 - 4 раза в день (4 - 8 капсул в сутки). Продолжительность лечения зависит от степени выраженности симптомов заболевания и определяется врачом. Дозировка при хроническом воспалении также рекомендуется и при длительном лечении. Если после лечения улучшения не наступает в течение 10 дней или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **Побочное действие:**

Побочные эффекты перечислены ниже в убывающем порядке по частоте встречаемости:

Очень часто ( $\geq 1/10$ )

Часто ( $\geq 1/100 - < 1/10$ )

Иногда ( $\geq 1/1,000 - < 1/100$ )

Редко ( $\geq 1/10,000 - < 1/1,000$ )

Очень редко ( $< 1/10,000$ )

Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным)

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта

Часто: боль в желудке; иногда: гастрит, гастроэнтерит, тошнота, рвота, диарея, метеоризм, сухость во рту, изменение вкуса.

Расстройства иммунной системы, поражения кожи и подкожных тканей

Иногда: аллергические реакции (одышка, отек лица, сыпь, крапивница, зуд, бронхоспазм); неизвестно: тяжелые анафилактические реакции.

Расстройства со стороны нервной системы

Иногда: головная боль, головокружения.

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей

Очень редко: повышение подвижности имеющихся камней в почках.

Нарушения со стороны печени и желчных путей:

Очень редко: повышение подвижности имеющихся камней в желчном пузыре.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка:**

При случайной передозировке эвкалиптового масла могут появиться желудочные симптомы (например, тошнота, рвота) и одышка. В тяжелых случаях передозировка может привести к конвульсиям, коме или нарушению дыхания. В редких случаях после тяжелой интоксикации возможны нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы. Лечение: Необходимость терапевтического вмешательства зависит от принятого внутрь количества эвкалиптового масла и тяжести клинических симптомов. Если принятое внутрь количество мало и пациент не проявляет симптомов или страдает только от слабо выраженных симптомов, таких как рвота или небольшая сонливость, обычно достаточно наблюдать пациента в течение нескольких часов.

После приема внутрь большого количества эвкалиптового масла или в случае тяжелых клинических симптомов, рекомендуется промывание желудка после эндотрахеальной интубации и инстилляцией активированного угля.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Препарат Респиро Миртол не следует применять одновременно с лекарственными препаратами с узким терапевтическим индексом. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением Респиро Миртол проконсультируйтесь с врачом.

### **Особые указания**

Перед приемом Респиро Миртол поговорите со своим врачом или провизором.

Если после применения препарата симптомы сохраняются или ухудшаются, появляется одышка, лихорадка, гнойная или кровавая мокрота, необходимо немедленно обратиться к врачу,

При бронхиальной астме, коклюше или других респираторных заболеваниях, которые связаны с выраженной гиперчувствительностью дыхательных путей, Респиро Миртол применяется только после консультации с врачом.

Респиро Миртол содержит сорбитол. Если Вы страдаете от редко встречающейся наследственной непереносимости фруктозы, Вам не следует применять препарат Респиро Миртол.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:**

В период лечения препаратом необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, так как применение препарата может в редких случаях вызвать головокружение.

### **Форма выпуска:**

Капсулы кишечнорастворимые 120 мг. По 10 капсул в блистерную упаковку. По 2 блистерных упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

### **Условия хранения:**

В оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 °С.

### **Хранить в недоступном для детей месте!**

### **Срок годности:**

3 года. Не применять препарат по истечении срока годности.

### **Условия отпуска:**

Отпускают без рецепта.

### **Владелец регистрационного удостоверения:**

Г. Польш-Боскамп ГмБХ & Ко. КГ  
Килер Штрассе 11  
25551 Хохенлокштедт, Германия

### **Название и адрес производителя:**

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG  
Kieler Strasse 11  
2551 Hohenlockstedt, Germany  
Г. Польш-Боскамп ГмБХ & Ко. КГ

Килер Штрассе 11  
25551 Хохенлокштедт, Германия

**Адрес для предъявления претензий:**

ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини», Россия  
123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, БЦ «Башня на Набережной», Блок Б.  
Тел. (495) 785-01-00, факс (495) 785-01-01.